

Afrykański pomór świń - ASF



Główny Inspektorat
Weterynarii



ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność

Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF.

Objawy kliniczne ASF:
nagle padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka (często z domieszką krwi), wymioty, ronienia u macior prośnych.

! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów jest obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.

 @WetG1W

 Rzeczpospolita
Polska

 Unia Europejska



Główny Inspektorat
Weterynarii



ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność



Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików.

W przypadku wystąpienia ASF w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! **Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF.**

Objawy kliniczne ASF:

nagle padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka (często z domieszką krwi), wymioty, ronienia u macior prośnych.

! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów **jest obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.**



§

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 marca 2026 r. w sprawie środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń

PAMIĘTAJ !!!

utrzymuj świnie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach

zabezpieczaj budynek przed dostępem innych zwierząt

przed wejściami i wyjściami do i z pomieszczeń używaj urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję lub wyłóż maty dezynfekcyjne

przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa oraz wybiegu używaj urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję (niecki dezynfekcyjne lub maty dezynfekcyjne)

karm świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt

myj i odkażaj ręce oraz obuwie

używaj dedykowanej do prac tylko przy świniami odzieży oraz obuwia roboczego

myj i odkażaj narzędzia oraz sprzęt do obsługi świń minimum raz dziennie

zwalczaj gryzonie

STOSUJ ZAKAZY !!!

karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszarów objętych ograniczeniami II, III (chyba że zastosowano obróbkę w celu unieszkodliwiania ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni)

wykorzystywania słomy na ściółkę pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III (chyba że zastosowano obróbkę w celu unieszkodliwiania ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 90 dni)

obsługi świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu lub odłowach zwierząt łownych

wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, zwłok, tusz, części tusz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF

wchodzenia osobom postronnym do budynków, w których są utrzymywane świnie

pożyczania sprzętu do obsługi świń do innych gospodarstw